



CYPEREX® 400 PM

Ambiente controlado por muito mais tempo

Ação residual
Baixo custo
Facilidade de dosagem

Código Comercial	
500 g (granel)	101.095
500 g (sachês)	101.057
500 g (display)	101.071

Composição

Cipermetrina 40% (p/p)

Formulação

Pó molhável (PM)

Indicações de uso

Inseticida pó molhável, com ação residual prolongada, para uso profissional e em campanhas de saúde pública. Indicado no controle de mosquitos, moscas, baratas, pulgas e besouros. Pode ser aplicado em diversos locais como residências, indústrias, edifícios comerciais e instalações rurais.

Mecanismo de ação

Cipermetrina - Inseticida do grupo químico Piretroide, modulador dos canais de sódio; prolonga ou impede o fechamento normal dos canais após a transmissão do impulso nervoso, o que ocasiona na constante entrada de sódio na célula nervosa, resultando em impulsos nervosos repetitivos, exaustão e morte do inseto.

Apresentação

Embalagem de 500 g com sachês hidrossolúveis de 25 g, Embalagem de 500 g a granel e Caixa display com sachês hidrossolúveis de 25g

Modo de usar

Realizar pré-diluição do produto colocando 1/3 da quantidade total de água para a aplicação; adicione a quantidade necessária do produto e agite a calda para uma completa dissolução; posteriormente complete com a quantidade total de água. Aplicar através de pulverização utilizando ponta de pulverização 80.02 na dosagem especificada na tabela abaixo, diretamente sobre as pragas alvo do controle ou em seus locais de pouso, abrigo e passagem, como paredes, frestas, rachaduras, rodapés, embaixo e atrás de móveis.

Pragas alvo	Dosagem	Calda
Baratas, pulgas, mosquitos, moscas e cascudinho	50 g/10 L de água para tratamento de choque	10 L/200 m ²
	25 g/10 L de água para tratamento de manutenção	

Ciclo de tratamento

O ciclo de tratamento deve ser repetido a cada semestre ou com outra frequência. É necessário manter vigilância entomológica para determinar o melhor calendário da aplicação ou suspensão do tratamento.

Precauções

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não comer, fumar e nem beber durante a aplicação. **Não aplicar sobre ou no corpo de animais de criação ou animais domésticos.** Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Evitar contato com a pele e os olhos. Advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupas protetoras adequadas, luvas, proteção ocular e/ou respiratória. Não jogue no fogo ou incinerador.



Fórmula molecular

$C_{22}H_{19}Cl_2NO_3$
Cipermetrina

Toxicologia

DL50 oral aguda para ratos..... > 2.000 mg/Kg

DL50 dermal aguda para ratos..... > 2.000 mg/Kg

Classificação toxicológica

Cipermetrina - Classe II

Período de reentrada

Manter o ambiente totalmente ventilado durante e após a aplicação. A reentrada deve ser realizada assim que as superfícies tratadas estiverem secas. Exceto idosos, grávidas, animais domésticos e pessoas alérgicas que só devem retornar ao local 24 horas após a aplicação.

Vazamento acidental

Em caso de derramamento, isole e sinalize a área contaminada, absorver o produto com material inerte, tais como terra, areia, caulim e recolha com auxílio de uma pá para área de descarte de lixo químico.

Eliminação e descarte

Não reutilizar as embalagens vazias. As sobras e resíduos dos produtos devem ser descartados conforme a legislação municipal e/ou estadual vigente. As embalagens vazias devem ser devolvidas a um posto de recebimento de embalagens credenciado pelo fabricante.

Primeiros socorros

Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com produto lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente em água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão não provoque o vômito.

FABRICADO POR: NEOGEN

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964

CEP: 12412-800

Distrito Industrial, Pindamonhangaba/SP

CNPJ: 90.821.554/0001-42

Aut. Func. no MS nº: 3.00425-4

Indústria Brasileira - Site: www.rogama.com.br

E-mail: sac@neogen.com - SAC: (12) 3644.3030

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Princípio ativo: Cipermetrina

Grupo químico: Piretróide

Antídoto/Tratamento: Não há antídoto. Tratar clinicamente os sintomas manifestados dependendo da via de exposição.

TELEFONE DE EMERGÊNCIA - 24 h:

0800 014 11 49

Nº de Registro no MS: 3.0425.0082.001-7

Nº do CAS: Cipermetrina: 52315-07-8



NEOGEN.com

sac@neogen.com | (12) 3644.3030