



Baixa Toxicidade
Não repelente e não desalojante
Ação residual
Baixo odor

Código Comercial

1 L

101.096

Composição

Etofenproxi 10% (p/p)

Formulação

Suspensão Concentrada (SC)

Indicações de uso

Inseticida líquido (suspensão concentrada), com ação residual, baixo odor e baixa toxicidade para diluição em água, destinando ao uso profissional e em campanhas de saúde pública. Indicado no controle de mosquitos, baratas, pulgas, moscas, traças, percevejos de cama e cupins subterrâneos. Pode ser aplicado em diversos locais como residências, indústrias, comércios e locais sensíveis como áreas alimentícias, hospitais e creches.

Mecanismo de ação

Etofenproxi: Inseticida do grupo químico éter difenílico, modulador dos canais de sódio; prolonga ou impede o fechamento normal dos canais após a transmissão do impulso nervoso, o que ocasiona na constante entrada de sódio na célula nervosa, resultando em impulsos nervosos repetitivos, exaustão e morte do inseto.

Apresentação

Caixa com 12 frascos autodosador de 1 L



VECTRON® 10 SC

Formulação exclusiva, de baixa toxicidade e com ação residual

Modo de usar

Agite bem antes de usar. Diluir o produto em água, homogeneizar e aplicar através de pulverização, utilizando ponta de pulverização 80.02 na dosagem especi cada na tabela abaixo, diretamente sobre os animais alvo do controle ou em seus locais de pouso e abrigo e passagem, como buracos, frestas, rachaduras, rodapés, embaixo e atrás de móveis.

Pragas alvo	Dosagem
Baratas, pulgas, moscas e traças	200 mL/10 L de água
Percevejos de cama	300 mL/10 L de água
10 litros de calda para uma área de 200 m ²	
Mosquitos (<i>Anopheles</i> spp. e <i>Aedes aegypti</i>)	50 mL/1 L de água
Aplicar na vazão de 700-800 mL/minuto, a uma distância de 45 cm da superfície (cerca de 40 mL/m ²) correspondente a uma dose final de 0,2 g.i.a./m ²	
Cupins subterrâneos	200 mL/10 L de água
Tratamento pré-construção: 5L/m ² de solo. Trincheiras: 5L/m linear, perfurações com 15 cm de largura e 30 cm de profundidade. Injeção no solo: 5L/m linear, perfurações a cada 30cm com 30 cm de profundidade.	

Precauções

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE. Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários. Não comer ou fumar durante a aplicação. Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias. Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais domésticos. Evitar contato com a pele e os olhos. Advertir aos usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes. Usar roupas protetoras adequadas, luvas, proteção ocular e respiratória.



Fórmula molecular

$C_{25}H_{28}O_3$
Etofenproxi

Toxicologia

DL50 oral aguda para ratos.....> 42.880 mg/Kg (ativo)

DL50 dermal aguda para ratos....>42.880 mg/Kg (ativo)

Classificação toxicológica

Etofenproxi - Classe IV

Período de reentrada

Manter o ambiente totalmente ventilado durante e após a aplicação. A reentrada pode ser realizada assim que as superfícies tratadas estiverem secas; exceto idosos, crianças, gestantes, convalescentes, pessoas alérgicas e animais domésticos, que só devem retornar ao local 24 horas após aplicação.

Sinais e sintomas de intoxicação

Reações alérgicas, salivação, irritabilidade, tremores e ataxia, distúrbios respiratórios e cardiovasculares.

Armazenagem

Armazenar o produto em local adequado e longe de fontes de calor.

Vazamento acidental

Absorver o produto com material inerte tal como: papel toalha, terra, areia, caulim e pano. Isolar e sinalizar a área.

Eliminação e descarte

Não reutilize as embalagens vazias. As sobras e resíduos dos produtos devem ser descartadas conforme a legislação municipal e/ou estadual vigente. As embalagens vazias devem ser submetidas ao processo de tripla lavagem e devolvidas em um posto credenciado pelo fabricante.

Primeiros socorros

Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou o Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Em caso de contato direto com o produto lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de ingestão acidental não provoque o vômito.

FABRICADO POR: NEOGEN

Av. Alexandrina das Chagas Moreira, 964

CEP: 12412-800

Distrito Industrial, Pindamonhangaba/SP

CNPJ: 90.821.554/0001-42

Aut. Func. no MS nº: 3.00425-4

Indústria Brasileira - Site: www.rogama.com.br

E-mail: sac@neogen.com - SAC: (12) 3644.3030

INDICAÇÕES PARA USO MÉDICO

Princípio ativo: Etofenproxi

Grupo químico: Éter difenílico

Antídoto/Tratamento: Anti-histamínico/Tratamento sintomático

TELEFONE DE EMERGÊNCIA - 24 h:

0800 014 11 49

Nº de Registro no MS: 3.0425.0154.001-8

Nº do CAS: Etofenproxi: 80844-07-1

