



////// Ficha Técnica

# Racumin® Pó Profissional



**Marca Comercial:** Racumin® Pó Profissional

**Nome Técnico:** Cumatetralil

**Grupo Químico:** Hidroxicumarinas

## INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO

**Grupo químico**

Hidroxicumarinas

**Nome comum**

Cumatetralil

**Antídoto/ Tratamento**

Vitamina K1 e tratamento sintomático. Em caso de ingestão, fazer lavagem até 2 horas após a ocorrência de ingestão de quantidades consideráveis, administrar carvão ativado e sulfato de sódio. Dar vitamina K1 hidrossolúvel por via intravenosa. Transfusão de sangue quando os fenômenos forem muito graves. Acompanhar o nível de protrombina até normalização.

**Telefone de Emergência Médica**

0800 701 0450

**Informações Toxicológicas**

0800 02 43 334

**TeleBayer**

0800 017 99 66

## COMPOSIÇÃO

**Ingrediente ativo**

4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl) coumarin

p.a. Cumatetralil 0,7500% p/p

Benzoato de Denatonium 0,0010%

**Inertes**

Corante, estabilizante, inertes 99,2498 % p/p

**Fórmula Bruta**

$C_{19}H_{16}O_3$

**Classe**

Raticida

**Tipo de Formulação**

Pó de contato

**Dados Toxicológicos**

Toxicidade aguda: DL50 oral, ratazana: aprox. 5000 mg/kg (Bayer); DL50 dérmica, ratazana: > 5000 mg/kg (Bayer)

## Indicações de Uso

Racumin® Pó Profissional é um raticida à base de Cumatetralil indicado para o controle de ratos, ratazanas e camundongos.

## Modo de Uso

Aplicar o produto diretamente nos locais com infestações de roedores como tocas, buracos, frestas ou outros esconderijos. Não interferir nas características do local para não alterar as trilhas naturais do roedor. Aplique Racumin® Pó Profissional diretamente nos esconderijos de forma a encaixar a saída da embalagem não deixando o produto exposto. Se possível, obstruir as saídas com terra ou outro material de vedação.

## Dosagens

### Aplicar 50g por toca sem a utilização de um pulverizador.

Renovar sempre que necessário até que não se perceba mais sinais da presença de roedores. Este será o sinal de que os roedores foram controlados.

Importante: Produto exclusivo de uso profissional. Antes de usar, siga rigorosamente as instruções do rótulo.

## Recomendações de uso

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original.
- CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE.
- Não coloque este produto em utensílio para uso alimentar.
- Siga corretamente as recomendações do rótulo. Evite acidentes.
- Durante o manuseio, usar calças compridas, blusa de manga comprida, luvas, proteção ocular e máscara FFP2 e evitar contato com a pele, boca e olhos. Não comer, beber nem fumar.
- VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES OU EMPRESAS ESPECIALIZADAS.
- Para descarte de embalagem, observe a legislação Municipal, Estadual e Federal.
- Em caso de acidente, recolha o produto com o auxílio de uma pá limpa, evitando a formação de poeira. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão, tomando medidas preventivas para evitar contaminação do meio ambiente pelas águas residuais. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente.
- Mantenha o produto em lugar seco, fresco e ventilado, ao abrigo de luz solar direta.
- Depois de aplicar o produto e, no caso de contato com a pele, lavar com água e sabão em abundância, em contato com os olhos, lavar com água em abundância.
- Reaplicar o produto quando houver indícios de nova infestação.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes.
- Aplicar em locais inacessíveis para crianças e animais domésticos.
- Orientar que o ponto de iscagem seja observado diariamente pelo adulto morador, impedindo a entrada de crianças e animais domésticos no local até sua efetiva retirada.
- Uma vez consumido o pó raticida, a limpeza de eventuais resíduos (estimados em cerca de 10 a 20% da isca), deve ser feita com calças compridas, blusa de manga comprida, luvas e máscara FFP2 e colocando em saco plástico devidamente fechado e encaminhado para destinação final.
- Em caso de ingestão não provoque o vômito
- Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente.
- As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida
- Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza
- Usar calças compridas, blusa de manga comprida, luvas, proteção ocular e máscara FFP2
- Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos
- Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes
- Não se deve contaminar os cursos de água
- Queimar ou enterrar os roedores mortos e eliminar os restos do produto de forma segura.
- Para o descarte de embalagem consulte o fabricante.

Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 3.3222.0049

N.º C.A.S. do ativo: 5836-29-3

Informações comerciais: tabela

