



Rodilon® Soft Bait



Marca Comercial: Rodilon® Soft Bait

Nome Técnico: Difetialona

Grupo Químico: Benzotiopiranonas

INDICAÇÃO PARA USO MÉDICO

Grupo químico

Benzotiopiranonas

Nome comum

Difetialona

Antídoto/ Tratamento

Vitamina K1 e tratamento sintomático.

Telefone de Emergência Médica

0800 701 0450

Informações Toxicológicas

0800 02 43 334

TeleBayer

0800 017 99 66

COMPOSIÇÃO

Ingrediente ativo

3-[(1RS, 3RS; 1RS,3SR)-3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphyl]-1-benzothi-in-2-one.

I.A: Difetialona 0,0025% p/p;

Inertes

Atrativos, antioxidante, agente amargante, aglutinante e corante 99,9975 % p/p.

Fórmula Bruta

$C_{31}H_{23}BrO_2S$

Classe

Raticida

Tipo de Formulação

Isca

Dados Toxicológicos

Toxicidade aguda - DL50 oral (ratos): > 2000 mg/kg p.c.; DL50 dérmica (ratos): > 2000 mg/kg p.c.

Indicações de Uso

A isca pronta para uso, **Rodilon® Soft Bait** é um raticida com grande atratividade para controle de camundongos, ratos e ratazanas. O ingrediente ativo difetialona é um anticoagulante de última geração, eficaz contra roedores resistentes aos anticoagulantes de primeira geração. A atividade antivitaminica K da difetialona ocorre no fígado do roedor tendo duração maior que os anticoagulantes de primeira geração. É eficaz em dose única e sua ação se manifesta por hemorragias internas nos roedores, permitindo o controle de toda a colônia. Sua formulação é muito atrativa garantindo o consumo imediato pelos roedores. Rodilon® Soft Bait possui uma substância amargante, à qual os roedores são insensíveis, reduzindo o risco de ingestão humana, especialmente, por crianças e de animais de estimação.

Modo de usar

O produto Rodilon® Soft Bait vem pronto para o uso. Basta colocar os sachês, sem abri-los, no local de iscagem, evitando o contato com o produto.

Dosagens

Camundongos 1 - 2 sachês por ponto de iscagem com espaçamento entre 1 a 2 metros

Ratos e ratazanas 3 - 6 sachês por ponto de iscagem com espaçamento entre 4 a 10 metros

Adaptar o número de sachês conforme o local de iscagem, seguindo a dosagem recomendada e respeitando os intervalos de aplicação do produto. O número de pontos de iscagem varia em função do local e gravidade da infestação. Rodilon® Soft Bait pode ser utilizado em caixas porta-iscas ou presos com arame. Sempre que possível, usar caixas porta-iscas.

Importante: Produto exclusivo de uso profissional. Antes de usar, siga rigorosamente as instruções do rótulo.

Locais de aplicação de uso

Colocar Rodilon® Soft Bait nos locais onde se observam sinais da presença de roedores, como por exemplo: em ninhos, áreas de passagem de roedores, perto das paredes, tocas e onde forem encontradas evidências de fezes, pelos e gordura. Manter a oferta do produto até que não se evidenciem mais sinais da presença dos roedores.

Recomendações de uso

Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários.

- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto.
- CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.
- Não reutilizar as embalagens vazias.
- Manter o produto na embalagem original.
- Em caso de contato com este produto, lave a parte atingida com água fria corrente e sabão.
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância.
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado.
- ESPECIALIZADAS.
- Em caso de ingestão não provoque o vômito.
- Não aplicar em tubulações de ar ou fontes de ventilação que possibilitem a liberação do rodenticida no ambiente.
- As mulheres grávidas não podem manipular o rodenticida.
- Conservar o local desratizado em perfeita condição de limpeza.
- Não transportar nem armazenar com alimentos nem medicamentos.
- Produto tóxico para mamíferos, aves e peixes.
- Não se deve contaminar os cursos de água.
- Queimar ou enterrar os roedores mortos e eliminar os restos do produto de forma segura.
- Durante o manuseio, usar luvas e evitar contato com a pele, boca e olhos. Não comer, beber, nem fumar.
- Para o descarte de embalagem consulte o fabricante.
- Mantenha o produto em lugar seco, fresco e ventilado, ao abrigo de luz solar direta.

Registrado no Ministério da Saúde sob n.º: 3.3222.0047

N.º C.A.S. do ativo: 104653-34-1

Informações comerciais: tabela

